Новые американские клинические рекомендации (AGA)

фармакологическая терапия язвенного колита средней и тяжелой степени[1]

** Адаптировано из рекомендаций AGA (Американской гастроэнтерологической ассоциации)*

ВЗРОСЛЫЕ ПАЦИЕНТЫ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ ОТ УМЕРЕННОЙ ДО ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

Умеренная и тяжелая степень ЯК, критерии:

- Умеренные или тяжелые симптомы, при оценке эндоскопии по шкале Мэйо от 2 до 3 баллов
- Легкие симптомы, но высокая степень воспаления или неблагоприятный прогноз
- Пациенты, зависимые от кортикостероидов, либо резистентные к пероральным кортикостероидам



Раннее применение современных методов лечения и/или иммуномодулирующей терапии **рекомендуется** вместо постепенной эскалации методов терапии (step-up§ стратегии)

(Условная рекомендация, очень низкая достоверность доказательств)

Рекомендуется использовать один из перечисленных препаратов вместо выжидательной тактики: ведолизумаб, голимумаб, анти-ИЛ23#, инфликсимаб, озанимод, анти-ИЛ23#, тофацитиниб*, упадацитиниб*, устекинумаб и S1PR-модулятор#

(Сильная рекомендация, умеренная достоверность доказательств)

Предлагается использование одного из перечисленных препаратов вместо выжидательной тактики: адалимумаб, анти-ИЛ23#, JAK-ингибитор#

(Условная рекомендация, умеренная достоверность доказательств)

ГРАДАЦИЯ ПРЕПАРАТОВ ПО СТЕПЕНИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛИНИИ ТЕРАПИИ:

	Препараты высокой эффективности	Препараты средней эффективности	Препараты низкой эффективности
Бионаивные пациенты (терапия первой линии)	ведолизумаб, анти-ИЛ23#, инфликсимаб, озанимод, анти-ИЛ23#, упадацитиниб*, S1PR-модулятор#	голимумаб, анти-ИЛ23#, тофацитиниб*, устекинумаб, JAK-ингибитор#*	адалимумаб
Пациенты, ранее получавшие терапию, особенно анти-ФНО	тофацитиниб, упадацитиниб*, устекинумаб	Анти-ИЛ23#, Анти-ИЛ23#, Анти-ИЛ23#, JAK-ингибитор#	адалимумаб, ведолизумаб, озанимод, S1PR-модулятор#

*Согласно инструкции FDA, ингибиторы JAK следует применять только у пациентов с предшествующей неудачей или непереносимостью анти-ФНО.

Препараты ранжированы в алфавитном порядке.

Препарат по состоянию на 26.02.25. не зарегистрирован в РФ для лечения язвенного колита.

§ Step-up терапия — это стратегия, при которой лечение начинается с применения стандартных методов терапии и при их неэффективности осуществляется переход на препараты биологической терапии и таргетных иммуносупрессоров (адаптация определения из ссылка).

ЯК — язвенный колит. ВЗК — воспалительные заболевания кишечника. Анти-ИЛ23 — ингибитор интерлейкина 23. S1PR-модулятор — модулятор сфингозин-1-фосфатного рецептора. Анти-ФНО — антагонисты фактора некроза опухоли. FDA (Food and Drug Administration) — федеральное агентство США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Ингибиторы JAK — ингибиторы янус-киназы.

1. Адаптировано из Siddharth Singh et al. AGA Living Clinical Practice Guideline on Pharmacological Management of Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis. Gastroenterology, Volume 167, Issue 7, 1307–1343.

Данный материал предназначен для специалистов здравоохранения.
Информация не является рекомендацией компании Такеда, рекламой компании или ее продукции, не должна быть основанием для принятия каких-либо решений или осуществления каких-либо действий. Решение о выборе метода лечения конкретного пациента должно приниматься лечащим врачом.

ООО «Такеда Фармасьютикалс»
ул. Усачёва, дом 2, стр. 1, 119048, г. Москва, Россия
Тел: +7 (800) 700-55-11, факс: +7 (495) 502-16-25
www.takeda.com/ru-ru/

VV-MEDMAT-117958, март 2025